Risultati clinici in Italia dal 1992



Terapia antinfiammatoria

Antalgica, infiltrante, mirata, profonda, non invasiva, non a contatto, non dolorosa.

"Infiltrazioni" non invasive

Trattasi di unità terapeutiche a tripla azione, ad onde soniche pressorie, a radiofrequenza con campo elettromagnetico ionizzante (risonanza magnetica), ad energia ossigenatoria di ozono, emesse sotto forma di scarica visibile ed udibile con effetto termico.

Ciclo terapeutico

1 volta a settimana (in quanto l'effetto della terapia dura per sette giorni). Si ripete per 6/8 sedute, dalla durata di 10 minuti circa l'una.

Non ci sono controindicazioni

Non produce effetti collaterali. Non si esegue in stato di gravidanza, su ferite aperte, occhi, organi genitali e nella zona adiacente al pace maker.

Indicazioni terapeutiche

ARTROSI: temporo mandibolare - colonna cervicale, dorsale, lombare - sacroiliaca - coccige - spalla - gomito - polso - mano - anca - ginocchio - caviglia - piede.

PATOLOGIE: artrite, periartrite scapolo omerale - tendinite - epicondilite - periostite - borsite - meniscopatia - sinovite - discopatie - protrusione - ernia - radicolite - sciatalgia - pubalgia - tunnel carpale - metacarpalgia - dito a scatto - rizartrosi - tallonite - fascite plantare - entesite - sperone calcaneare - metatarsalgia - alluce valgo - sesamoidi - neuroma di Morton - tendinite calcifica - calcificazioni.

TRAUMI: Trauma articolare - contusivo - distorsivo - tendineo - muscolare - ematoma.



AP Pizzini & Carassia STUDIO FISIOTERAPICO Via Candia 102 - 00192 Roma Telefono 06 39 36 66 41 info@apfisioterapiaroma.it www.apfisioterapiaroma.it